



| Edad  | Vacuna                              | Dosis                                      | Enfermedad que previene                                      |   |
|---|-------------------------------------|--|--|---|
| <b>Recién nacido</b>  | BCG                                 | Única                                      | Meningitis tuberculosa                                       |   |
|   | Hepatitis B                         | Recién nacido                              | Hepatitis B  |   |
| <b>Leche materna exclusiva</b>  |                                     |  |  |   |
| <b>A los 2 meses</b>  | Pentavalente                        | Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)      | Primera  | Difteria - Tos ferina - Tétanos   |
|   |                                     | <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo b (Hib) |  | Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo b |
|   |                                     | Hepatitis B                                |  | Hepatitis B   |
|   |                                     | Polio                                      |  | Poliomielitis   |
|   |                                     | Rotavirus                                  |  | Diarrea por Rotavirus   |
|   |                                     | Neumococo                                  |  | Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia  |
| <b>Leche materna exclusiva</b>  |                                     |  |  |   |
| <b>A los 4 meses</b>  | Pentavalente                        | Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)      | Segunda  | Difteria - Tos ferina - Tétanos   |
|   |                                     | <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo b (Hib) |  | Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo b |
|   |                                     | Hepatitis B                                |  | Hepatitis B   |
|   |                                     | Polio                                      |  | Poliomielitis   |
|   |                                     | Rotavirus                                  |  | Diarrea por Rotavirus   |
|   |                                     | Neumococo                                  |  | Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia  |
| <b>Continúe la leche materna hasta que cumpla dos años e inicie alimentación complementaria nutritiva</b> |                                     |  |  |   |
| <b>A los 6 meses</b>  | Pentavalente                        | Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)      | Tercera  | Difteria - Tos ferina - Tétanos   |
|   |                                     | <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo b (Hib) |  | Meningitis y otras enfermedades causadas por <i>Haemophilus Influenzae</i> tipo b |
|   |                                     | Hepatitis B                                |  | Hepatitis B   |
|   |                                     | Polio                                      |  | Poliomielitis   |
| <b>A los 7 meses</b>  | Influenza estacional                | Primera                                    | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza |   |
|   | Influenza estacional*               | Segunda                                    | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza |   |
| <b>A los 12 meses</b>   | Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP) | Primera                                    | Sarampión - Rubeola - Paperas                                |   |
|   | Varicela                            | Primera                                    | Varicela   |   |
|   | Neumococo                           | Refuerzo                                   | Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia                   |   |
|   | Hepatitis A                         | Única                                      | Hepatitis A  |   |

| Edad   | Vacuna   | Dosis  | Enfermedad que previene                                      |
|--|--|--|--|
| <b>A los 18 meses</b>                                      | Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)            | Primer refuerzo  | Difteria - Tos ferina - Tétanos                              |
|  | Polio  | Primer refuerzo  | Poliomielitis  |
|  | Fiebre Amarilla (FA)                             | Única  | Fiebre amarilla  |
| <b>A los 5 años</b>  | Difteria - Tos ferina - Tétanos (DPT)            | Segundo refuerzo   | Difteria - Tos ferina - Tétanos                              |
|  | Polio  | Segundo refuerzo   | Poliomielitis  |
|  | Sarampión - Rubeola - Paperas (SRP)              | Refuerzo   | Sarampión - Rubeola - Paperas                                |
|  | Varicela   | Refuerzo   | Varicela   |
| <b>Niñas a los 9 años</b>                                  | Virus del Papiloma Humano (VPH)**                | Primera: Fecha elegida   | Cáncer de cuello uterino                                     |
|  |  | Segunda: 6 meses después de la primera dosis   |  |
| <b>Mujeres en Edad Fértil (MEF) entre los 10 y 49 años</b> | Toxoides tetánico y diftérico del adulto (Td)*** | 5 dosis:<br>Td1: dosis inicial<br>Td2: al mes de Td1<br>Td3: a los 6 meses de Td2<br>Td4: al año de Td3<br>Td5: al año de Td4<br>Refuerzo cada 10 años | Difteria - Tétanos - Tétanos neonatal                        |
| <b>Gestantes</b>   | Influenza estacional                             | Una dosis a partir de la semana 14 de gestación en cada embarazo   | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza |
|  | TdaP (Tétanos - Difteria - Tos ferina Acelular)  | Dosis única a partir de la semana 26 de gestación en cada embarazo   | Tétanos neonatal - Difteria - Tos ferina del recién nacido   |
| <b>Adultos de 60 años y más</b>                            | Influenza estacional                             | Anual  | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza |

\*Aplicar una dosis de refuerzo contra influenza estacional entre los 12 y 23 meses de edad.

\*\* Las niñas inmunocomprometidas deben recibir un esquema de 0, 2 y 6 meses.

\*\*\*De acuerdo al antecedente vacunal de DPT y Td.

#### Niñas y niños con esquema de vacunación tardío de vacunación

##### Entre 12 y 23 meses sin antecedente vacunal

- 1 dosis de BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa
- 3 dosis de polio con intervalo de 4 semanas
- 1 dosis de pentavalente. Se completa con:
  - 2 dosis de DPT con intervalo de 4 semanas
  - 2 dosis de hepatitis B con intervalo de 4 semanas
- 1 dosis de triple viral más un refuerzo a los 5 años de edad (mínimo 1 mes entre las dosis)
- 1 dosis de fiebre amarilla
- 1 dosis de hepatitis A
- 1 dosis de varicela más un refuerzo a los 5 años de edad (mínimo 3 meses entre las dosis)
- 2 dosis de neumococo con un intervalo de 2 meses

##### Niños con esquema de vacunación incompleto

- Revisar, continuar y completar el esquema según antecedente vacunal.

##### Entre 2 y 5 años sin antecedente vacunal

- 1 dosis de BCG si pertenece a población indígena o rural dispersa
- 3 dosis de polio con intervalo de 4 semanas
- 1 dosis de DPT con intervalo de 4 semanas, Completar esquema con los 2 refuerzos respectivos con DPT o TD pediátrico según sea el caso.
- 3 dosis de hepatitis B con intervalo de 4 semanas.
- 1 dosis de triple viral más un refuerzo a los 5 años de edad (mínimo 1 mes entre las dosis)
- 1 dosis de fiebre amarilla
- 1 dosis de hepatitis A
- 1 dosis de varicela más un refuerzo a los 5 años de edad (mínimo 3 meses entre las dosis)
- 1 dosis de neumococo

##### Niños con esquema de vacunación incompleto

- Revisar, continuar y completar el esquema según antecedente vacunal.